



جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي
جامعة بغداد
كلية التمريض

وقائع

المؤتمر العلمي السنوي السابع عشر لكلية التمريض
تحت شعار

التمريض الجامعي ودوره
في خدمة المجتمع

٢٣ - ٢٤ تشرين الأول ٢٠١٣ م

المؤتمر العلمي السنوي السابع عشر

لكلية التمريض / جامعة بغداد

لجان المؤتمر

اللجنة التحضيرية

١. أ.د. اقبال غانم علي / عميدة كلية التمريض / جامعة بغداد / رئيساً
٢. أ.م.د. وداد كامل محمد / معاون العميد الاداري / مقررأ
٣. أ.م.د. ربيعة محسن علي / معاون العميد للشؤون العلمية / عضوا
٤. أ.م.د. هدى باقر حسن / رئيس قسم الاختصاصات التمريضية / عضواً
٥. م.د. أيمن عبد الوهاب سلمان / رئيس قسم العلوم الطبية والاساسية / عضواً
٦. أ.م.د. حليلة يوسف كاظم / رئيس فرع تمريض البالغين / عضواً
٧. م.د. علي دخان عباس / رئيس فرع أساسيات التمريض / عضواً
٨. م.د. ختام مطشر خطاب / رئيس فرع تمريض الاطفال / عضواً
٩. م.د. سهاد حكمت خيري / رئيس فرع تمريض صحة الام والطفل / عضواً
١٠. م.د. حسن علي حسين / رئيس فرع تمريض الصحة النفسية والعقلية / عضواً

اللجنة العلمية

١. أ.د. بتول أمين جدوع / رئيساً
٢. أ.د. اقبال غانم علي / عضواً
٣. أ.د. اقبال مجيد عباس / عضواً
٤. أ.د. نديم محمد طاهر / عضواً
٥. أ.م.د. زمان عبد الصاحب عبد / عضواً
٦. أ.م.د. هدى باقر حسن / عضواً
٧. م.د. معن حميد أبراهيم / عضواً
٨. م.د. سهاد حكمت خيري / مقررأ

اللجنة الاجتماعية

١. م.د. وسام جبار قاسم / رئيساً
٢. م.ج. وفاء عبد علي خطاب / مقررأ
٣. م.د. ختام مطشر خطاب / عضواً
٤. م.د. سعاد جاسم محمد / عضواً
٥. م.د. سلوى غازي تركي / عضواً
٦. م.د. رجاء ابراهيم عبد / عضواً
٧. أ.م.د. حسين هادي عطية / عضواً

اللجنة المالية

١. أ.م.د. وداد كامل محمد / رئيساً
٢. الانسه بشائر ناصر علي / عضواً
٣. السيدة سورية جابر توثلي / عضواً
٤. الانسه ليلي حميد حسين / مقررأ

اللجنة الإعلامية

م.م. نهى عادل ابراهيم / رئيساً
م.م. محمد باقر عباس / مقررأ
م.م. زيد وحيد / عضواً
م.م. مصعب ماجد/عضواً
السيد نوار احسان / عضوا

لجنة التشريعات

أ.م.د. فاتن عبد الأمير محمد / رئيساً
م.م.رجاء طارق حسن /مقررأ
م.ج سمر حسين كريم /عضواً
م.م.أقدس داود سلمان / عضواً
م.ج.علياء خزل عل نعمه / عضواً
م.ج.باسمة عامر ناجي / عضواً
م.ج شيماء محمد حسين/ عضواً
م.ج فاطمة فاضل بنیان/عضواً

الفهرست

الموضوع	الصحيفة
الرؤية والرسالة واهداف الكلية	٣
مستخلصات البحوث	٤
أثر الدور الفاعل للتدريسي في تعميق المادة الدراسية لدى الطالب	٥
مشكلات مخرجات العملية العلمية والمهارية لكليات التمريض في العراق للسنوات العشرة الاخيرة (٢٠٠٣-٢٠١٣)	٦
Assessment of Clinical Learning Environment and Clinical Training for Students in Maternal and Child Health Nursing	٧
نوعية الحياة لمرضى الصرع في مدينة بغداد	٨
Feeding Problems in Children with Congenital Heart Disease in Nasiriya Heart Center	٩
Assessment of Mothers' Knowledge and Practices with Hemophilic Children type A at Azadi Teaching Hospital in Kirkuk City	١٠
Effects of Spontaneous Abortion upon Women's Psychological Domain of Quality of Life	١١
Assessment of Using New Strategies for Self-learning for Graduate Nurses in Baghdad City Hospitals	١٢
The impact of early and late adolescent pregnancies on some adverse maternal and neonatal health	١٣
Cell Injury and New Therapy	١٤
Correlations of morphological (macroscopic and microscopic) parameters of placenta with maternal age and parity	١٥
منهاج المؤتمر	١٨-١٦

رؤية ورسالة وأهداف الكلية

الرؤية: تسعى كلية التمريض في جامعة بغداد الى أن تكون مركزاً متقدماً في التقدم العلمي في مجال التمريض وارتباطه في الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع وفق رؤية جامعة بغداد.

الرسالة: تعمل كلية التمريض في جامعة بغداد بكل جدٍ ومثابرة على إعداد ملاكات تمريضية تمتلك المؤهلات العلمية للعمل في القطاع (العام والخاص) ولها القدرة على تقديم الرعاية التمريضية الشاملة (العلاجية والوقائية والتأهيلية) للفرد والأسرة والمجتمع.

الأهداف:

١. تنمية قدرات الطلبة على اعتماد التفكير الناقد.
٢. تنمية قدرات الطلبة على اعتماد اسلوبي التعلم الذاتي وحل أو تجاوز المشكلات.
٣. تنمية قدرات الطلبة على اتباع الخطوات العلمية في تقديم الرعاية التمريضية.
٤. تنمية الشخصية القيادية لدى الطلبة وبما يخدم في اتخاذ القرار.
٥. تنمية الفهم الواسع لدى الطلبة لقواعد السلوك المهني.
٦. تنمية الفهم الواسع لدى الطلبة بما يخص الوصف الوظيفي والتحليل الوظيفي.
٧. تمكين الطلبة من فهم النظريات التمريضية ومبادئ العلوم التمريضية وتطبيقها عند تقديم الرعاية التمريضية وإدارة شؤون التمريض.
٨. توجيه إمكانية الطلبة نحو الشروع بإنجاز البحوث العلمية التطبيقية ذات العلاقة بموضوعات الرعاية التمريضية.

مستخلصات البحوث

1962 م

أثر الدور الفاعل للتدريسي في تعميق المادة الدراسية لدى الطالب

أ.م.د. هدى باقر حسن أ.م.د. ربيعة محسن علي
كلية التمريض / جامعة بغداد

المستخلص

تعد عملية التقويم في التربية والتعليم تشخيصاً للموقف، والأداء، من جميع نواحيه وهي المنهج والتدريسي والمؤسسة التعليمية والطالب، وهذا التقويم يساعد القائم على التقويم بوصف العلاج على هيئة توجيهات وخدمات ومساعدات، وقد تكون على هيئة قرارات تساعد التدريسي على تطوير أساليبه وتنميته مهنيًا لذا ارتأت الباحثتان إجراء الدراسة الحالية والتي تهدف الى التعرف على تقويم الطلبة للتدريسي والمفردة الدراسية التي يقوم بتدريسها التدريسي ذاته وكذلك إيجاد العلاقة بين فقرات تقويم التدريسي وفقرات تقويم المفردات الدراسية لاستمارة تقويم الأداء.

إجراءات البحث:

نوع الدراسة: دراسة استطلاعية (وصفية) أجريت للمدة من الأول من نيسان ٢٠١٣ ولغاية الثلاثون من تموز للعام ٢٠١٣ لغرض إيجاد الأثر الفاعل لدور التدريسي في تعميق المادة الدراسية
موقع الدراسة: أجريت الدراسة الحالية في كلية التمريض / جامعة بغداد

عينة الدراسة: تم اختيار ٥٢ طالب وطالبة بطريقة عشوائية من المرحلة الأولى لطلبة الدراسة الصباحية
أداة الدراسة: تم اختيار استبيان تقويم الأداء للتدريسي من قبل الطالب واستمارة تقويم الطالب للمفردة الدراسية التي يقوم بتدريسها التدريسي ذاته والمعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة بغداد في وحدة ضمان الجودة وكانت كالآتي:

المحور الأول: فقرات تقويم الطالب التدريسي والمكونة من ١٥ فقرة موزعة على مقياس خماسي وكالآتي (أوافق بشدة، أوافق، لا أعرف، لا أوافق، لا أوافق بشدة) وعلى درجات المقياس (١، ٢، ٣، ٤، ٥) على التوالي.

المحور الثاني: فقرات تقويم الطالب للمفردة الدراسية والمكونة من ١٨ فقرة موزعة على مقياس خماسي وكالآتي (أوافق بشدة، أوافق، لا أعرف، لا أوافق، لا أوافق بشدة) موزع على درجات المقياس (١، ٢، ٣، ٤، ٥) على التوالي.

الوسائل الإحصائية: تم استعمال الإحصاء الوصفي والمتضمن (النسبة المئوية والوسط الحسابي والانحراف المعياري) والإحصاء الاستدلالي والمتضمن (اختبار التباين)

النتائج: أشارت نتائج الدراسة بأن جميع الفقرات الخاصة بتقويم الطالب للمفردة الدراسية حصلت على مستوى عالٍ للوسط الحسابي ماعدا الفقرات المتعلقة بالمصادر التي تحفز الطالب على التفكير وفقرات تجهيز القاعات والمختبرات حصلت على مستوى متوسط وإن جميع الفقرات الخاصة بتقويم الطلبة للتدريسي حصلت على مستوى عالٍ وأوجدت الدراسة بوجود علاقة مؤثرة بين الفائدة المتوخاة من المادة الدراسية وطريقة إعطاء التدريسي للمادة العلمية بطريقة توازي وقت المحاضرة وبمستوى معنوية أقل أو يساوي 0.05

التوصيات: لذا أوصت الباحثتان بالآتي

- ١- ابتعاد التدريسي عن الدور التقليدي الإلقائي، وأن لا يكون وعاء للمعلومات بل إن دوره هو توجيه الطلاب عند الحاجة دون التدخل الكبير
- ٢- إلزام الخريجين الجدد بالحضور مع الأساتذة ذوي الخبرة في قاعات الدرس لاكتساب المهارة التعليمية وطرائق الاتصال الحديثة
- ٣-حث التدريسيين بالتواصل المستمر مع آخر المستجدات العلمية الحديثة في مجال اختصاصه لأن الطالب اليوم في حالة تواصل للمعلومات من خلال اشتراكه في شبكة التواصل الاجتماعي وغيرها.

مشكلات مخرجات العملية العلمية والمهارية لكليات التمريض في العراق للسنوات العشرة الأخيرة (٢٠٠٣-٢٠١٣)

أ.م.د. خالده محمد خضر

أ.م.د. حليمه يوسف كاظم
كلية التمريض / جامعة بغداد

المستخلص:

الهدف: تهدف الدراسة إلى تقييم مشكلات مخرجات العملية العلمية والمهارية لكليات التمريض في العراق للسنوات العشرة الأخيرة (٢٠٠٣-٢٠١٣)
المنهجية:

دراسة وصفية تقويمية للمدة من شهر ايار ٢٠١٣ إلى منتصف شهر أيلول ٢٠١٣ حيث جمعت البيانات بعد بناء استمارة استبيان من قبل الباحثين ذات العلاقة بأغراض الدراسة مكونه من ثلاثة أجزاء. الجزء الأول ويشمل المشكلات التي تخص الطالب والمكونة من (١٠) فقرات والجزء الثاني يخص المشكلات التي لها علاقة بآلية التعليم العالي وبيئته وتشمل (١٠) فقرات والجزء الثالث يخص المشكلات المتعلقة بالتدريسيين وتضم (٨) فقرات وتم تحديد مصداقية محتوى الاستمارة من خلال عرضها على خمسة خبراء من ذوي الاختصاص وثباتها من خلال احتساب معامل الارتباط بيرسن والذي كانت قيمته مقبولة = ٠.٨٠٧ وجمعت البيانات عن طريق ملء الاستمارة من قبل الأساتذة أنفسهم وعن طريق اعطائهم الاستمارة مباشرة أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم.

النتائج:

وقد تم تحليل البيانات من خلال تطبيق التحليل الوصفي (التكرار) والتحليل الاستنتاجي (الوسط الحسابي الموزون) باستخدام الحقيبة الاحصائية للعلوم الاجتماعية.

الاستنتاج:

تبين الدراسة أن هناك شدة عالية (مستوى عال) للفقرات التي تخص مشكلات الطالب وهي ازدياد عدد الطلبة كمّا وليس نوعاً والفقرة "منح الطالب أكثر من فرصتين في الامتحان" وكذلك الفقرة "اطمئنان الطالب بعدم المعاقبة عند كثرة الغيابات". أما فيما يخص مشكلات التي تخص آلية التعليم العالي، فكان أبرزها هو عدم قدرة الكليات على استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة. وبالنسبة للمشكلات التي تخص الأساتذة فقد تبين أن أبرز الفقرات هي قلة الإيفادات لمواكبة المستجدات الحديثة لعضو الهيئة التدريسية.

التوصيات: أوصت الدراسة بضرورة زيادة إيفاد التدريسيين خارج العراق لمواكبة المستجدات الحديثة وكذلك وضع ضوابط وشروط بقبول الطلبة المبني على النوعية الجيدة سواء للدراسات الصباحية أو المسائية وأيضاً قبول الطلبة حسب طاقة وإمكانية الكلية ورفض أية زيادة تؤثر في سلامة وصحة العملية التعليمية.

Assessment of Clinical Learning Environment and Clinical Training for Students in Maternal and Child Health Nursing

أ.د. اقبال مجيد عباس

م.م. رجاء طارق حسن

كلية التمريض / جامعة بغداد

المستخلص

الهدف: تقييم البيئة التعليمية السريرية والتدريب السريري للطلبة في تمريض صحة الأم والطفل.

المنهجية: أجريت الدراسة الوصفية على عينة غير احتمالية (غرضية) تكونت من ١٧٥ طالباً في كلية التمريض / جامعة بغداد ونفذت الدراسة للمدة من ١٩ حزيران إلى ١٨ تموز ٢٠١٣ واستعمل الاستبيان كأداة لجمع البيانات لتحقيق هدف الدراسة وتكون من ثلاثة أجزاء وتتضمن الخصائص الديموغرافية والبيئة السريرية وممارسات الطلبة لتمريض صحة الأم والطفل واستخدم الإحصاء الوصفي في تحليل البيانات.

النتائج: أظهرت النتائج أن معظم الطلبة أعمارهم تتراوح ما بين (١٩-٢٣) سنة وان ٥٦% من الطلاب ذكور، ٦٦,٩% من طلاب السنة الثالثة وأن ٥٩,٤% هم من الدراسة الصباحية. وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك درجة عالية من الاستجابة لعينة الدراسة ما عدا الفقرة (١١) وهي (بيئة التعلم في المستشفى مع الكلية بيئة متجانسة). وكشفت الدراسة أن هناك درجة عالية من الاستجابة لعينة الدراسة حول التدريب السريري.

التوصيات: أوصت الدراسة إلى الحاجة إلى إجراء بحوث لتقويم البيئة التعليمية السريرية الفعلية لمهارات وممارسات الطلبة وأداءهم في المستشفى وتحديد العوامل المؤثرة في الطلبة خلال البيئة التعليمية السريرية والتدريب السريري.

نوعية الحياة لمرضى الصرع في مدينة بغداد

الممرض الجامعي صباح عبد الله أ.م.د. وداد كامل محمد

كلية التمريض/ جامعة بغداد

المستخلص:

الهدف: تهدف الدراسة الى تعيين نوعية الحياة لمرضى الصرع في مدينة بغداد وايجاد العلاقة بين الجنس والعمر والحالة الزوجية و التحصيل التعليمي و المهنة، مع نوعية الحياة وكذلك المعلومات السريرية مع نوعية الحياة لمرضى الصرع في مدينة بغداد.

المنهجية: أجريت دراسة وصفية في العيادات الاستشارية لطب الجملة العصبية في مستشفيات بغداد (مستشفى بغداد التعليمي، مستشفى اليرموك التعليمي، مستشفى جراحة الجملة العصبية ومستشفى العلوم العصبية) للمدة من ١٥ كانون الأول ٢٠١٢ ولغاية ٣٠ تموز ٢٠١٣ اختيرت عينة غير احتمالية "غرضية" من (١٠٠) مريض مشخصين بالصرع والذين يرتادون العيادات الاستشارية في المستشفيات المذكورة أعلاه. جمعت المعلومات من خلال استخدام استبيان مصمم و مكون من ثلاثة أجزاء؛ الجزء الأول شمل صفحة البيانات الديموغرافية و يحتوي (٨) فقرات والجزء الثاني شمل المعلومات السريرية الخاصة بمرضى الصرع و المتكون من (٦) فقرات، والجزء الثالث المسح الخاص بنوعية الحياة (نوعية الحياة لمرضى الصرع-٣١). حدد ثبات استمارة الاستبيان من خلال إجراء الدراسة المصغرة وحددت مصداقيته من خلال مجموعة من الخبراء (١٩) خبير. تم وصف وتحليل البيانات إجراءات التحليل الإحصائي الوصفي وإجراءات التحليل الاستنتاجي في تحليل البيانات.

النتائج: أظهرت نتائج الدراسة أنّ نوعية الحياة لدى المرضى قد سجلت مستوى متوسط. كما وأظهرت النتائج وجود علاقة معنوية ما بين (المستوى التعليمي والحالة الاقتصادية الاجتماعية، مدة الإصابة وكذلك تكرار التعرض للنوبة) ونوعية الحياة، وعدم وجود علاقة معنوية ما بين (الجنس، الحالة الزوجية، الحالة المهنية، نوع النوبة وعدد الأدوية المستخدمة لعلاج الصرع) ونوعية الحياة.

الاستنتاجات: استنتجت الدراسة أنّ نوعية الحياة لمرضى الصرع قد سجلت مستوى متوسط، كما أنّ أغلبية المرضى كانوا من الشباب ذوي مستوى تعليمي متدني ومستوى اقتصادي متوسط وكذلك أكثر من نصف العينة هم من غير المتزوجين وربات البيوت وكذلك لديهم زيادة بتكرار عدد النوبات.

Feeding Problems in Children with Congenital Heart Disease in Nasiriya Heart Center

Oday Faris Wishel

Prof. Dr. Eqbal Ghanim Ma'ala

Abstract

The child's nutrition may be compromised following an episode of illness or surgery. Infants and children with congenital heart diseases exhibit a range of delays in weight gain and growth pattern due to feeding problems that impact upon energy and growth outcome and this result might be due to less amount of body required of nutrition which related to the disease and prevents child to get enough nutrition from feeding.

Objective: To identify feeding problems of children with congenital heart disease.

Methodology: Non probability (purposive) sample of (65) were selected of 225 children who visit the heart center during the period of conducting the pilot study, previously diagnosed with congenital heart disease.

Results: The study results indicated that children with congenital heart disease have feeding difficulties, low birth weight, repeated diarrhea, more than half of the sample taking medication for heart disease which cause repeated vomiting, difficulty taking liquids and refusal of feeding or eating, (64.6%) of study sample suffered from wasting. (78.5%) suffered from stunting. And almost half of the study sample (49.2%) suffered from malnourished.

Recommendation: The study recommended an establishment of feeding unit, located at heart disease hospitals and health centers, to teach the families the methods of feeding through teaching program for the purpose of raising their awareness about child's feeding problems.

Assessment of Mothers' Knowledge and Practices with Hemophilic Children type A at Azadi Teaching Hospital in Kirkuk City

م.د. ختام مطشر خطاب

الممرض الجامعي آرام محمد
كلية التمريض / جامعة بغداد

المستخلص

الهدف: تهدف الدراسة لتقييم معارف وممارسات الأمهات تجاه أطفالهن المصابين بمرض الناعور نوع -أ- وتقييم حالتهم الاجتماعية والاقتصادية وإيجاد العلاقة بين المعلومات الديموغرافية، معارف وممارسات الأمهات اتجاه أطفالهن المصابين بمرض الناعور بمستشفى آزادي التعليمي بمحافظة كركوك.

المنهجية: دراسة وصفية تم اختيار عينة غير عشوائية (غرضية) مكونة من (٥٥) أم أطفالهن مصابين بمرض الناعور نوع -أ-، بدأت من تشرين الثاني ٢٠١٢ إلى أيار ٢٠١٣. وتم إجراء الدراسة في مستشفى آزادي العام التعليمي بمحافظة كركوك وتكونت الاستمارة الاستبائية من خمسة أجزاء تشمل الخصائص الديموغرافية لكل من الأم والطفل والحالة الاجتماعية الاقتصادية للأسرة ومعارف وممارسات الأم من خلال إجراء المقابلة المباشرة مع الأمهات في المستشفى وتم تحديد صدق المحتوى وثبات الاستمارة الاستبائية من خلال دراسة استطلاعية واستخدام التحليل الإحصائي الوصفي الاستنتاجي في تحليل البيانات.

- النتائج: تشير نتائج الدراسة إلى أن (٣٠.٩%) من الأمهات كانت أعمارهن من (٤٠ - ٤٤) و(٤٣.٩%) كانوا من خريجي الابتدائية. وأطفالهن كلهم ذكورا وأن (٤١.٨%) من الأطفال كانت أعمارهم بين (٥-٩) سنوات وأن (٣٠.٩%) ليسوا في المدرسة وأن (٦٩.١%) من الأسرة لديهم طفل واحد مصابا بالمرض و(٢٧.٦%) كانت إصابتهم بالمفصل، بالنسبة إلى مستوى شدة المرض (٦٥.٥%) كانت متوسطة و(٩٨.٢%) من الأسرة يعتمدون على المستشفى لإعطاء العامل الثامن للطفل عند حدوث النزف وأن (٦١.٨%) حالتهم الاجتماعية- الاقتصادية ضعيفة وأن (٨٣.٦%) من الأمهات غير متأكدات من معلوماتهن وأن ممارساتهم كانوا (٧٢.٧%) أحيانا. وأن (٢٣.٦%) أبدا اتجاه أطفالهن المصابين.

- التوصيات: تطوير برنامج وكتيب خاص للأمهات باللغات المحلية (كردية والتركمانية) واستحداث برامج ودورات التوعية نظرية وعملية للأمهات وتحسين واقعهم الاقتصادي لتقليل معاناة الأسرة وتجهيز عامل التخثر الثامن للمستشفيات والمراكز الصحية بأطراف المدينة لمناطق تواجد المرضى.

Effects of Spontaneous Abortion upon Women's Psychological Domain of Quality of Life

أ.م.د. ربيعة محسن علي

الممرضة الجامعية سراب نصر
كلية التمريض/ جامعة بغداد

المستخلص

الخلفية: يعد الإجهاض التلقائي أحد أهم النتائج العكسية للحمل والذي يؤثر في إنجابية الإنسان. ومخاطره لا تتأثر فقط بالعوامل البيولوجية العامة مثل العمر، عدد مرات الحمل وتاريخ الإجهاض السابق، وإنما يتأثر أيضاً بالصفات الاجتماعية الشخصية وكذلك بالبيئة الاجتماعية.

الهدف: لمعرفة العلاقة بين المجال النفسي لنوعية الحياة مع متغيرات الدراسة (الديموغرافية، الإنجابية). **المنهجية:** أجريت دراسة وصفية على عينة غير احتمالية (غرضية) من (٢٠٠) امرأة تعاني من الاجهاض التلقائي متواجدة في ردهات النسائية والتوليد في أربع مستشفيات في مدينة بغداد وتشمل: مستشفى الكرخ التعليمي للولادة، مستشفى العلوية التعليمي للولادة، مستشفى اليرموك التعليمي ومستشفى بغداد التعليمي. استخدمت الاستبانة كأداة لجمع المعلومات للمدة من ٣ شباط ٢٠١٣ إلى ٢٦ نيسان ٢٠١٣ لتحقيق هدف الدراسة وتتكون من أربعة أجزاء تتضمن الخصائص الديموغرافية، الإنجابية، أسباب الإجهاض التلقائي والمجال النفسي لنوعية الحياة. تم إجراء الدراسة الاستطلاعية لاختبار ثبات الاستبانة وجرى صدق المحتوى من خلال (٢٠) خبير واستخدام الإحصاء الوصفي في تحليل البيانات.

النتائج: أظهرت النتائج إن (٢٦.٥%) من النساء معدل أعمارهن يتراوح بين (٢٥-٢٩) سنة ومعدل كتلة الجسم (٤٨%) ضمن الوزن الطبيعي و(٢٧.٥%) خريجات ابتدائية و(٢٥%) من الأزواج خريجون كلية أو معهد و(٨٠%) ربات بيوت و (٥٤.٥%) من الأزواج موظفون و (٤٨%) منهم ضمن مستوى اقتصادي واطئ. أما عن المعلومات الإنجابية (٦٦%) من النساء أما بكرية أو متعددة الحمل و(٢٥%) من النساء لديهن على الأقل ولادتين و(٥٢.٥%) لديهن إجهاض واحد سابق. كذلك عن العلاقة بين الجانب النفسي لنوعية الحياة والمعلومات الديموغرافية (العمر) (٠,٠٠٦) وبين الجانب النفسي والمؤشرات الإنجابية (عدد الولادات) (٠,٠٣١).

الاستنتاجات: استنادا إلى نتائج الدراسة فقد تبين أن هناك تأثيرات نفسية سلبية تؤثر على الأم في عمر الإنجاب وكذلك تأثيرات نفسية سلبية للنساء سواء كانت بكرية أو متعددة الحمل.

التوصيات: لقد أوصت الدراسة بعمل برنامج تعليمي للنساء خلال الحمل يتضمن (معنى الإجهاض التلقائي، أسبابه والوقاية منه). كما أوصت الدراسة بتعزيز الرعاية النفسية للنساء في مراكز الرعاية الصحية وكذلك أوصت الدراسة بنشر الوعي عن هذه المشكلة من قبل وزارة الصحة من خلال عمل كتيب أه

Assessment of Using New Strategies for self-learning for graduate nurses in Baghdad city hospitals

Dr. Suhad H. Khairi

Assistant Instructor Aqdas D. Salman

Abstract

A cross section study was conducted to assess the use of new strategies for self-learning for graduate nurses in Baghdad city hospitals.

Aim: Assess the new strategies for self-learning that graduate nurses used in their workplace, to assess the opinions about ways that used in development their professional experiences and to evaluate self development Program from graduated nurse's point of view.

Methodology: A purposive "non probability" sample that consists of eighty (80) nursing college graduated staff of both sexes who worked in seven hospitals at morning shift in Baghdad city. Data were collected through the use of the questionnaire form during the period from March to June 2013. Descriptive statistical procedures were used to analyze the data.

Results: The results showed that the highest percentage of the study sample aged between (43.8%) of study sample were at age group (20-29) years, more than half of the study sample were male the highest percentage (41%) of study sample had eleven or more years experiences, (39%) of study sample worked in medical word . Results of the study revealed that most (97.5%) of study sample having desire to develop their knowledge about profession the highest percentage (73.8 %, 72.5%) of them developing their knowledge through E-learning and continuous education programs respectively. More than three third of study sample applying what studied in their workplace, however the same percentage (71.2%) did not using new strategies that they did not used before in developing their profession, the highest percentage (67.5%) of study sample considered continuous education program is the highest ways that they used in developing their professional experiences, most of the study sample considered knowledge about using computer a great benefit obtain from self development program.

Recommendations: Activation and encourage the learning and self development programs in health settings, annual exam need for graduated nursing staff with certification for upgrade, administration facilitated self learning courses atmospheres and recourses for graduated nursing staff and develop an awareness of the learning opportunities present in the workplace.

Conclusion: The study concluded that most of study sample having desire to develop their knowledge about profession, they developed their knowledge through only E-learning and continuous education programs and how using computer is an important mean to obtain their new knowledge.

The impact of early and late adolescent pregnancies on some adverse maternal and neonatal health

أ.م.د. سوسن علي محمود

أ.م.د. عز الدين فخر الدين بهاء الدين
كلية التمريض/ جامعة بغداد

المستخلص

الهدف: التعرف على أهم المشكلات الصحية التي تتعرض لها اليافعات الحوامل وتأثيرها في نتائج الحمل الصحية للأم والطفل اثناء الولادة وما بعدها في مدينة بغداد، وكذلك التعرف على المعلومات الديموغرافية للعينة.

المنهجية: دراسة وصفية غرضية اجريت على ٣٥٠ يافعة حامل بعمر ١٣-١٩ سنة ممن أكملن الأسبوع ٢٨ أو أكثر من حملهن واللاتي تمت احوالتهن إلى ردهة الولادة في مستشفى العلوية التعليمي لغرض الولادة، تم تقسيم العينة الى جزئين وهما اليافعات الفتيات وعددهن ١١٠ حالة والتي تتراوح أعمارهن ما بين ١٣-١٦ سنة واليافعات الأكثر نضجاً وعددهن ٢٤٠ حالة واللاتي تتراوح أعمارهن ما بين ١٧-١٩ سنة. اجريت الدراسة للمدة من ٨ تشرين الأول ٢٠١٢ - ٣٠ حزيران ٢٠١٣ وتم جمع البيانات من خلال المقابلة المباشرة مع الحوامل قبل وبعد الولادة وكذلك فحص الوليد سريرياً وقد نظمت البيانات في استمارة استبائية معدة لهذا الغرض مسبقاً.

النتائج: أظهرت نتائج الدراسة التي خضعت للتحليل الإحصائي أنّ معظم اليافعات الفتيات يعشن في مناطق زراعية (٥٦.٤%) ولديهن التحصيل الدراسي الابتدائي (٥٥.٥%) وهن ربات بيوت (٥٠%) ويعشن في أسر ممتدة (٦٩.١%) ولديهن صلة قرى مع أزواجهن (٦٥.٥%)، كما تبين أنّ معظم المضاعفات الصحية قبل الولادة مثل فرط ضغط الدم المتسبب بالحمل (١٥.٥%) وخمج المسالك البولية المزمنة (٢١.٨%) وكذلك أعلى نسبة للعمليات القيصرية الطارئة (٣٧.٣%) وحالات النزف الرحمي بعد الولادة (٢٤.٥%) وحدث الخمج النفاسي (٧.٣%) وقلة وزن الوليد (٣٧.٣%) وضعف فعالياته الحيوية (١٩.١%) ومتلازمة عسر التنفس في عينة اليافعات الفتيات (٨.٢%)، في حين أظهرت هذه النتائج أنّ معظم الحوامل الأكثر نضجاً يعشن في مركز المدينة (٦١.١%) وفي أسر نووية مستقلة (٥١.٧%) وخريجات الدراسة المتوسطة (٣٤.٢%) وما زلن يكملن دراستهن وأن معظم حالات فقر الدم أثناء الحمل (٣٢.٩%) وهبوط ضغط الدم بعد الولادة (٢١.٣%) وجدت لديهن. ولذلك فإن الحمل عند اليافعات الفتيات تتصاحب مع عوامل خطيرة للأم ولطفلا نسبياً أكثر من نظيراتها الأكثر نضجاً. ووجد من خلال اعتماد أسلوب الإحصاء الوصفي (التكرار والنسبة المئوية) للمفردات، وتحقيق صدق محتوى الاستمارة من خلال مجموعة من الخبراء، تم تحليل البيانات بتطبيق التحليل الإحصائي الاستنتاجي (مربع كاي).

التوصيات: توصي الدراسة بتقديم المزيد من الرعاية الصحية والمتابعة للفتيات الحوامل خلال مدة حملهن وأثناء الولادة والتي يفضل أن تتم بواسطة من يمتلكون أعلى المهارات في حقل الاختصاص لتجنب المخاطر الصحية التي قد تحدث فضلاً عن متابعة حالتهن بعد الولادة، كما وتوصي بالتركيز على توعية المجتمع عبر مختلف الوسائل الإعلامية والبرامج التثقيفية بالآثار السلبية للزواج المبكر ومخاطره وأضراره على صحة الفتيات اليافعات ومواليدهن لتقليل التداعيات الخطيرة على صحة الأم والطفل.

Cell Injury and New Therapy

ا.م. د. أسعد إسماعيل أحمد
كلية التمريض / جامعة بغداد

Abstract

Stress may cause noticeable changes in the chemistry of the cell (cell injury). The most expected changes in the chemistry of the cell is the loss of magnesium and potassium, and replacing them by sodium and calcium which may lead to structural and functional disorders (cell apoptosis or necrosis). These are the main pathological mechanisms involved in the evolution of many chronic un-curable diseases, despite the use of different therapies and drugs for several decades. New virtual therapy (Immune Modulator) was manufactured to maintain magnesium and potassium availability on cellular level (Restorative Medicine) by using trace elements as modulator molecules, presenting outside the doses recommended by international organizations (Dietary Reference Intakes).

1962

Correlations of morphological (macroscopic and microscopic) parameters of placenta with maternal age and parity

Ass. Lect. Dr. Nameer F. AL-Kalifa** ; Prof. Dr. Malak A. Al-yawer*

Summary:

Background: Placenta is a leading cause of maternal and perinatal mortality and an important factor in fetal growth retardation. It undergoes different changes in weight, volume, structure, shape and function continuously throughout the gestation to support the prenatal life. Careful examination of placenta can give information which can be useful in the management of complications in mother and the newborn.

Objectives: The present work has been attempted towards determination of the morphological (macroscopic & microscopic) parameters of human full-term placentae and their relation with different parity and age group of mothers.

Patients & Methods: A total of 40 placentae were freshly collected. They were divided into four groups (10 women each); primigravida age<35 years, primigravida age>35 years, multigravida<35 years; multigravida > 35years. Neonatal and placental weights, placental thickness and number of cotyledons were measured. Tissue for histological examination was obtained to study the parameters of microscopic morphometry (number of apoptotic cells, number of terminal villi, number of syncytial knots, number of fetal capillaries and thickness of trophoblastic basement membrane)

Results: Placental & neonatal weights were within normal range. They were increased with maternal age and parity. Number of cotyledons was higher than those reported by other authors in other populations but it was still within normal range and it was significantly decreased in multigravida> 35. Placental thickness was within normal range and it was significantly decreased in multigravida> 35. All microscopic parameters were increased with maternal age and parity.

Conclusions: There were correlations between microscopic and macroscopic parameters. The length of stem villi were less in multigravida> 35 since placental thickness was decreased in this group. All microscopic parameters were increased with maternal age and parity. These changes may have some important bearing on the placental insufficiency in higher age group and parity of mother.

Key words: Neonatal weight, placental weight, placental thickness, number of cotyledons, apoptotic cells, terminal villi, syncytial knots, fetal capillaries, thickness of trophoblastic basement membrane



منهاج المؤتمر

جامعة بغداد

كلية التمريض

منهاج المؤتمر العلمي السنوي السابع عشر

اليوم الأول * الأربعاء ٢٣/١٠/٢٠١٣

١. ٩:٠٠ - ٩:٣٠ التسجيل
٢. ٩:٣٠ الافتتاح بتلاوة آية من القرآن الكريم
٣. تلاوة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق
٤. النشيد الوطني
٥. كلمة رئيس جامعة بغداد
٦. كلمة السيدة عميد كلية التمريض المحترمة
٧. توزيع دروع وهدايا المؤتمر
٨. الجلسة الأولى (بحوث توصيات المؤتمر السادس عشر)

مقرر الجلسة

رئيس الجلسة

أ.م.د. زمان عبد الصاحب عبد

أ.د. بتول أمين جدوع

١- أثر الدور الفاعل للتدريسي في تعميق المادة الدراسية لدى الطالب

أ.م.د. هدى باقر حسن / كلية التمريض / جامعة بغداد أ.م.د. ربيعة محسن علي / كلية التمريض / جامعة بغداد

استراحة

مقرر الجلسة

رئيس الجلسة

الجلسة الثانية

أ.م.د. حسين هادي

أ.د. نرمين بدري

٢- مشكلات مخرجات العملية العلمية والمهارية لكليات التمريض في العراق للسنوات العشرة الأخيرة

(٢٠٠٣-٢٠١٣)

أ.م.د. خالدة محمد خضر

أ.م.د. حليمه يوسف كاظم

3. Assessment of Using New Strategies for self-learning for graduate nurses in Baghdad city hospitals

م.م. أقدس داوود

م.د. سهاد حكمت

١٠. وجبة الغداء

اليوم الثاني * ٢٤/١٠/٢٠١٣

٨:٣٠ – ٩:٠٠ التسجيل

١. الجلسة الأولى

رئيس الجلسة

م.م. د. خالدة علوان

مقرر الجلسة

م.د. ايمان عبد الوهاب سلمان

١- نوعية الحياة لمرضى الصرع في مدينة بغداد

المرضى الجامعي صباح عبد الله

م.م. د. وداد كامل محمد

Assessment of Mothers' Knowledge and Practices with Hemophilic Children type A at Azadi Teaching Hospital in Kirkuk City

المرضى الجامعي آرام محمد

م.م. د. ختام مطشر

Effects of Spontaneous Abortion upon Women's Psychological Domain of Quality of Life

المرضى الجامعية سراب نصر

م.م. د. ربعة محسن علي

Assessment of Clinical Learning Environment and Clinical Training for Students in Maternal and Child Health Nursing

م.م. رجاء طارق حسن

م.د. إقبال مجيد عباس

٣. الجلسة الثانية

رئيس الجلسة

أ.م.د. فاتن عبد الأمير محمد

مقرر الجلسة

أ.م.د. زاهد جاسم محمد

The impact of early and late adolescent pregnancies on some adverse maternal and neonatal health

م.د. عز الدين فخر الدين بهاء الدين

أ.م.د. سوسن علي محمود

Cell Injury and New Therapy

أ.م.د. أسعد إسماعيل أحمد

Correlations of morphological (macroscopic and microscopic) parameters of placenta with maternal age and parity

أ.م.د. نعيم خليفة

أ.د. ملاك ارم

٤. توصيات المؤتمر

٥. اختتام المؤتمر

٦. وجبة غداء